

						گاوآژ	
						هدف از انجام پروسیجر	۱
						بیان نکات مورد بررسی و کنترل دستور پزشک	۲
						شستن دست ها و پوشیدن دستکش	۳
						شناسایی بیمار و توضیح روش کار	۴
						قراردادن بیمار در پوزیشن مناسب	۵
						اطمینان از وجود سوند به داخل معده بیمار	۶
						آماده کردن و کنترل محلول گاوآژ	۷
						کنترل حجم باقیمانده معده	۸
						اتصال سرنگ به سوند و قرار دادن آن در فاصله ۴۵-۴۰ سانتی متری از سطح شکم بیمار	۹
						ریختن ۲۰ تا ۳۰ سی سی آب در داخل سرنگ و بستن کلامپ قبل تمام شدن آب	۱۰
						ریختن محلول غذایی ولرم به داخل سرنگ و وارد کردن به آرامی در طی ۱۵-۱۰ دقیقه به معده	۱۱
						شستشوی شوند با ۲۰ تا ۳۰ سی سی آب	۱۲
						قرار دادن پیستون به داخل سرنگ و اتصال آن به انتهای سوند	۱۳
						قرار دادن بیمار به مدت ۳۰ دقیقه در وضعیت نیمه نشسته و متمایل به پهلوی راست	۱۴
						جمع آوری وسایل، خارج کردن دستکش و شستن دست ها	۱۵
						ثبت میزان مایع گاوآژ شده، ساعت آن و موارد عدم تحمل بیمار در پرونده و در فرم جذب و دفع	۱۶

نمره نهایی:

امضاء مربی