

ساکشن تراکئوستومی							
						هدف از انجام پروسیجر	۱
						بیان نکات مورد بررسی و کنترل دستور پزشک	۲
						شناسایی بیمار و توضیح روش کار	۳
						قرار دادن بیمار هوشیار در وضعیت نیمه نشسته و غیر هوشیار وضعیت به پهلو	۴
						شستن دست ها ،پوشیدن دستکش (یکبار مصرف) و استفاده از ماسک و عینک محافظ	۵
						برداشتن پانسمان محل تراکئوستومی در صورت آلوده بودن و در آوردن دستکش ها	۶
						کنترل و باز کردن ست استریل ساکشن	۷
						باز کردن کاتتر استریل و ریختن مقداری سرم شستشو داخل گالیپات	۸
						روشن کردن دستگاه ساکشن و تنظیم فشار مناسب	۹
						پوشیدن دستکش استریل	۱۰
						وصل کردن کاتتر استریل به لوله رابط ساکشن	۱۱
						کشیدن مقدار کمی نرمال سالین توسط کاتتر ساکشن	۱۲
						هیپر ونتیله کردن بیمار با اکسیژن ۱۰۰٪ (۳ تا ۶ تنفس با آمبوبگ)	۱۳
						وارد کردن کاتتر به اندازه ۱۲- ۱۰ سانتی متر وارد لوله تراکئوستومی در حالت خاموش	۱۴
						بستن دریچه واکيوم و انجام ساکشن به مدت ۱۰-۱۵ ثانیه با چرخاندن کاتتر بین انگشت شست و اشاره	۱۵
						باز نمودن دریچه واکيوم و خروج کاتتر به آرامی	۱۶
						شستشوی کاتتر با سرم شستشو	۱۷
						هیپر ونتیله کردن بیمار با اکسیژن صد در صد در فواصل بین هر ساکشن	۱۸
						در صورت نیاز انجام مجدد ساکشن با فاصله ۲۰-۳۰ ثانیه بین هر بار ساکشن (درمجموع ۵ دقیقه)	۱۹
						خاموش کردن دستگاه، خارج کردن کاتتر و دستکش	۲۰
						جمع آوری وسایل و شستن دست ها	۲۱
						ثبت در پرونده بیمار	۲۲